MAPA GEOLÓGICO
FOLHA SB.24-X-A-IV ITAPIÚNA
ESCALA 1:100.000 - CPRM, 2014

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE GEOLOGIA, MINERAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO MINERAL
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

ITAPIÚNA
FOLHA SB.24-X-A-IV

PROGRAMA GEOLOGIA DO BRASIL
CARTA GEOLÓGICA - ESCALA 1:100.000

Encarte Tectônico



Folha Itapiúna (SB.24-X-A-IV)

Província Borborema Setentrional

- DNC- Domínio Noroeste Ceará
- DCC- Domínio Ceará Central
- DOJ- Domínio Orós-Jaguaribe
- DPS- Domínio Rio Piranhas-Seridó
- DJC- Domínio São José do Campestre

Limite entre Domínios segundo Arthaud et al. (1998) (Ceará) e Medeiros & Jardim de Sá (2009) (Rio Grande do Norte)

Fanerozoico	Coberturas sedimentares
Paleozoico	Bacia do Parnaíba (intracratônica)
Eopaleozoico	Bacias Molassoides brasilianas (a) Bacia do Jaibaras; (b) Bacia do Cococi
Neoproterozoico	Granitoides Brasilianos
	Complexo Tamboril-Santa Quitéria
Núdleos Arqueanos	1 - Maciço São José do Campestre 2 - Complexo Granjeiro 3 - Complexo Cruzeta (Maciço de Tróia)

Zonas de Cisalhamento

ZCP- Zona de Cisalhamento Patos
ZCPJC- Zona de Cisalhamento Picuí-João Câmara
ZCPA- Zona de Cisalhamento Portalegre
ZCFB- Zona de Cisalhamento Farias Brito
ZCA- Zona de Cisalhamento Auaba
ZLJ- Zona de Cisalhamento Jaguaribe
ZCSP- Zona de Cisalhamento Senador Pompeu
ZCSI- Zona de Cisalhamento Sabonete-Inhamó
ZCO- Zona de Cisalhamento Orós
ZCT- Zona de Cisalhamento Tauá
ZCSPR- Zona de Cisalhamento Sobral-Pedro-II
FRG- Falha Rio Groaíras



MAPA AEROMAGNÉTICO (PRIMEIRA DERIVADA VERTICAL)



MAPA RADIOMÉTRICO TERNÁRIO



RELAÇÕES TECTONOESTRATIGRÁFICAS PÓS-ORDOVICIANAS

ERA	PERÍODO	IDADE (Ma)	DEPÓSITOS CENOZOICOS	MAGMATITOS
CENOZOICO	QUATERNÁRIO	2,59	Q2a	N2Q1c
	NEOGENO	23,3	ENb Grupo Barreiras	
	PALEOGENO	66		
MESOZOICO	CRETÁCEO	145		Rio Ceará-Mirim K1βcm

RELAÇÕES TECTONOESTRATIGRÁFICAS PRECAMBRIANO-EOFANEROZOICAS

PROVÍNCIA BORBOREMA
SUB-PROVÍNCIA SETENTRIONAL
DOMÍNIO CEARÁ CENTRAL



DESCRIÇÃO DAS UNIDADES

DEPÓSITOS CENOZOICOS

Q2a — **Depósitos aluvionares**: constituídos de areias quartzosas e feldspáticas, conglomeráticas, cascalhos e argilas.

N2Q1c — **Depósitos colúvio-aluviais**: sedimentos inconsolidados, de coloração esbranquiçada, distribuição irregular, predominantemente arenosos. Em alguns locais ocorrem materiais cascalhosos (seixos centimétricos) com matriz argilosa laterizada.

ENb — **Grupo Barreiras**: arenitos argilosos de tonalidade variável, matriz argilo-caulinítica, com cimento ferruginoso e, as vezes, silicoso. Granulação fina a média com leitos conglomeráticos e nódulos lateríticos.

RIO CEARÁ-MIRIM

K1βcm — Diabásios e gabros (menos frequentes) em jazimentos diques/formes.

GRANITO SERRA AZUL

PRrib — Granito porfirítico, amarelado a rosado, matriz de granulação grossa, localmente milonitizado. Rocha calcialcalina de alto K, metaluminosa a peraluminosa.

GRANITOIDE BOQUEIRÃO

NP3rb — Granitos e granodiortos de coloração cinza, granulação fina a grossa, microporfiríticos e isotrópicos.

SUITE PEDRA AGUDA

NP3γqz — Gabro-noritos e quartzo dioritos, coloração cinza a escuro, granulação média a grossa, com enclaves microgranulares máficos.

NP3'qz — Veios de quartzo.

GRANODIORITO VEADOS

NP3γve — Granitoide de variação composicional granítica a tonalítica, de quimismo predominantemente granodiorítico, cálcio-alcalino de alto K, peraluminoso, com tendência metaluminosa, fortemente deformado com aspecto facoidal. Matriz rica em biotita. São frequentes diques e injeções graníticas rosados e deformados.

MONZONITO QUIXADÁ

NP3've — Granitoides porfiríticos, com K-feldspato de 8cm, matriz rica em hornblenda e presença de cristais de titanita. Rochas de composições monzonítica, cálcio-alcalina de alto K, com tendência shoshonítica. Ocorrem frequentes enclaves magmáticos, geralmente, de composição shoshonítica (mingling). Diques e veios mais evoluídos, de composição granítica, estão presentes.

UNIDADE JUATAMA

NP3j — Diatexitos ricos em schlieren biotíticos e metatexitos, de coloração cinza a cinza rosado, geralmente ortoderivados, e subordinadamente ocorrem restitos de rochas calcissilicáticas. Por vezes, são observadas porções evoluídas (anatexitos).

LEUCOGRANITO ITAPIÚNA

PR7ii — Metaleucogranitos (anatexitos), tipo S, com ou sem granada e sillimanita, coloração cinza claro e esbranquiçado, de granulação fina a grossa, por vezes porfiríticos. Alguns são augen gnaisses e estão migmatizados. São frequentes porções diatexíticas, com restitos de paragnaisse e xisto. Ocorrem enclaves de anfibolito (metabasito), de forma e dimensões variadas em alguns leucogranitos gnaissificados. São de composição peraluminosa, cálcio-alcalina de alto K evolução em sílica. (2.400 Ma TDM, diatexito)

LEUCOGRANITO IBICUITINGA

PRrib — Metaleucogranitos (anatexitos), tipo S, com granada, as vezes a duas micas e sillimanita, coloração esbranquiçado, de granulação fina a grossa, gnaissificados, alguns migmatizados. Ocorrem restitos xistosos.

COMPLEXO CEARÁ

NP2ci — **Unidade Independência**: paragnaisses, micaxistos (x) e quartzitos (q) metamorfizados, geralmente, em fácies anfibolito. Na base ocorrem metatexitos estromatíticos (i).

NP2ix — **Unidade Quixeramobim**: xistos (predominante), paragnaisses e quartzitos, metamorfizados em fácies anfibolito, com faixas migmatíticas (metatexitos e diatexitos).

PRcq — **Unidade Caninde do Ceará Central**: diatexitos e metatexitos paraderivados, principalmente de metassedimentos biotita gnaisses, com ou sem granada e sillimanita. Leucossomas quartzo-feldspáticos possuem geralmente granada, as vezes grafita. Ocorrem níveis xistosos, com grafita e restóculos de manganês, além de lentes de quartzito (q), mármore, rocha calcissilicática e anfibolito, geralmente metamorfizados em fácies anfibolito alto a granulito.

GRUPO ORÓS

PP2ai — **Formação Santanim**: Quartzitos intercalados com micaxistos diversos, associados a mármores, rochas calcissilicáticas, metachert, além de metavulcânicas félsicas e máficas, metamorfizados em fácies xisto-verde a anfibolito alto. (~ 1.700 Ma U-Pb idade máxima de deposição/zircões detríticos, quartzo xisto).

COMPLEXO SÃO JOSÉ DE MACAOCA

PP2sgmp — Paramigmatitos, frequentemente com estruturas bandada-dobradas, leucossomas graníticos com granada e grafita associadas, além de subordinadas lentes anfibolíticas.

PP2'γgm — Ortognaisses acrescentados, migmatíticos, granulação média a grossa, por vezes porfiríticos, localmente com estruturas bandada-dobradas, com lentes de rochas anfibolíticas. São comuns feições de mingling. São de composições dioríticas, tonalíticas e granodioríticas, normalmente metaluminosas e cálcio-alcalinos de médio K. (2.140 Ma U-Pb; 2.270 Ma TDM ortogneisse tonalítico)

PP2'γgm — Ortognaisses cinzentados, granulação fina a grossa, alguns porfiríticos, de estruturas bandadas, com raras lentes anfibolíticas. São de composição granítica a granodiorítica, subordinadamente tonalítica, metaluminosos e cálcio-alcalinos de alto K. (2.200 Ma TDM, ortognaisse granítico).

ORTOGNAISSE CIPÓ

g — PP2'cip — Ortognaisses acrescentados migmatíticos, granulação média a grossa, de estruturas bandadas, com raras lentes anfibolíticas. São de composição granítica a granodiorítica a tonalítica (trondhjemítica). São metaluminosos e cálcio-alcalinos de médio K, com tendência a baixo K. Em porções com alta taxa de migmatização ocorrem termos evoluídos de composição granítica (g).

COMPLEXO ALGODÕES

PP2algnaf — Segmento gnáissico-anfibolítico migmatizado em diversos estágios. Ocorrem paramigmatitos com ou sem granada, geralmente associados a anfibolitos (PP2ial) e rochas metamafica-metaultramafica (talco xisto, hornblendito e metagabro) (PP2ibmal). Além disso, são encontrados sheets de ortognaisses concordantes e níveis de leucogranitos concordantes as paraderivadas.

COMPLEXO JAGUARETAMA

PP2j — Diatexitos e metatexitos paraderivados com ou sem granada, associados a lentes de anfibolitos e, subordinadamente, a ortognaisses migmatizados, de granulação fina a média, coloração cinza e composição granodiorítica. (2.720 Ma TDM, migmatito paraderivado).

CONVENÇÕES GEOLÓGICAS

- Eixo de dobra
- Lineação de estiramento mineral com mergulho medido (10)
- Foliação principal com mergulho medido (40)
- Foliação vertical
- Foliação milonítica
- Traço de foliação
- Lineamento estrutural
- Falha ou fratura inferida
- Antiforme
- Antiforme inclinado
- Antiforme com caimento indicado
- Sinforme
- Dique básico
- Dique ácido
- A——B Perfil geológico
- Zona de cisalhamento contracional
- Zona de cisalhamento indiscriminada
- Zona de cisalhamento transcorrente
- Zona de cisalhamento transcorrente dextral
- Zona de cisalhamento transcorrente sinistral
- Zona de cisalhamento transpressional dextral

Geocronologia

- Sm-Nd (TDM)
- U-Pb (LA-ICPMS) zircão detrítico/idade máxima deposicional
- U-Pb diluição isotópica em zircão

Ocorrência Mineral

- Ocorrência
- Garimpo ativo
- Garimpo paralisado
- Mina ativa
- Mina paralisada

Mn = Manganês, gf = Grafita, ti = Talco, qz = Quartzo rósea, ca = Calcário, ro = Rocha ornamental, arg = Argila, ar = Areia, pc = Pedra de cantaria

CONVENÇÕES CARTOGRÁFICAS

- Vila/Cidade
- Localidade
- Propriedade rural
- Caminho
- Trilha
- Rodovia pavimentada
- Rodovia não pavimentada
- Curso de água perene
- Curso de água intermitente
- Corpo d'água

ARTICULAÇÃO DA FOLHA

Canindé SB.24-V-B-III	Baturité SB.24-X-A-I	Beberibe SB.24-X-A-II
Quixadá SB.24-V-B-VI	Itapiúna SB.24-X-A-IV	Bonhu SB.24-X-A-V
Quixeramobim SB.24-V-D-III	Banabuiú SB.24-X-C-I	Limoeiro do Norte SB.24-X-C-II

LOCALIZAÇÃO DA FOLHA



Equipe Executora

Autor

Geologia e Recursos Minerais

Edney Smith de Moraes Palheta

Colaboradores

Petrografia

Ianonira Paiva Gomes

Geoquímica de Prospecção

Wanessa Souza Marques
Antônio Celso Rodrigues de Melo
Raimundo Anunciato de Carvalho
Vicente Calixto Duarte Neto

Geofísica

Tércyo Rinaldo Gonçalves Pinéo

Cartografia Digital & SIG

Guilherme Marques e Souza
Edney Smith de Moraes Palheta

Diretor da DGM

Roberto Ventura Santos

Chefe do DEGEO

Reginaldo Alves dos Santos

Coordenação Técnica Nacional

Editon José dos Santos (DIGEOB)
João Henrique Gonçalves (DIGEOP)

Coordenação Técnica Regional

Antônio Maurílio Vasconcelos (Coord. Exec. DGM/REFO)
José Adilson Dias Cavalcanti (Ass. de Prod. DGM/REFO)
Francisco Edson Mendonça Gomes (Ass. de Prod. DRI/REFO)

Base planimétrica digital obtida da carta impressa Itapiúna, publicada em 1982 pelo IBGE, ajustada às imagens do Mosaico GeoCover - 2000, ortorretificado e georreferenciado segundo o datum WGS-84, de imagens ETM+ do LANDSAT-7 resultante da fusão das bandas 7, 4, 2 e 8, com resolução espacial de 14,25 metros. Esta base foi editada e atualizada pela Divisão de Cartografia - DICART, para atender ao mapeamento temático do Serviço Geológico do Brasil - CPRM.
A atualização dos topônimos referentes às localidades foi obtida do IBGE.

O Projeto Folha Itapiúna é uma ação do Programa Geologia do Brasil – PGB, executado pelo Serviço Geológico do Brasil – CPRM, através de suas Unidades Regionais, sob a coordenação do Departamento de Geologia – DEGEO/Diretoria de Geologia e Recursos Minerais – DGM.
Esta folha foi executada pela Residência de Fortaleza – REFO.
Os mapas geológico e de recursos minerais da Folha Itapiúna são suportados por banco de dados geológico e de recursos minerais, disponíveis em versão GIS.

Citação bibliográfica:

Palheta, E. S. M. 2013. Programa Geologia do Brasil - PGB. Itapiúna. Folha SB.24-X-A-IV. Estado do Ceará, Carta Geológica. Fortaleza: CPRM, 2013, 1 mapa colorido, 91,04 x 65,79 cm. Escala 1:100.000.

PERFIL GEOLÓGICO



MAPA GEOLÓGICO

ESCALA 1:100.000

2 1 0 2 4 6 km

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR

Origem da quilometragem UTM: equador e meridiano central 39° W acrescidas as constantes: 10.000 km e 500 km, respectivamente.

Datum horizontal: WGS84

Declinação magnética do centro da folha: 21°37'58" W (em 14/01/2013). Cresce anualmente -0°00'26".

2014

CPRM Serviço Geológico do Brasil
Secretaria de Geologia, Mineração e Transformação Mineral
Ministério de Minas e Energia
GOVERNO FEDERAL BRASIL PAÍS RICO É PAÍS SEM POBREZA