MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
SECRETARIA DE MINAS E METALURGIA
CPRM - SERVIÇO GEOLÓGICO DO BRASIL

GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
SECRETARIA DE MINAS E ENERGIA
COMPANHIA MINERADORA DE MINAS GERAIS

PROGRAMA LEVANTAMENTOS GEOLÓGICOS BÁSICOS DO BRASIL
CARTA GEOLÓGICA - ESCALA 1:100.000

FOLHA SE.23-V-B-IV - SERRA DO BOQUEIRÃO

CARTA GEOLÓGICA
Folha SE.23-V-B-IV - SERRA DO BOQUEIRÃO
Escala 1:100.000 - CPRM - 2002

SINOPSE GEOLÓGICA

INTRODUÇÃO

O Projeto São Francisco é o resultado de uma parceria entre o Governo Federal, através da CPRM – Serviço Geológico do Brasil, Empresa Pública vinculada ao Ministério de Minas e Energia – Secretaria de Minas e Metalurgia e o Governo de Minas Gerais, através da Secretaria de Estado de Minas e Energia – SEME e Companhia Mineradora de Minas Gerais – COMIG. O Projeto tem por finalidade mapeamento geológico, cadastro de recursos minerais e cadastro e avaliação dos recursos hídricos subterrâneos na porção mineira da Bacia do São Francisco. A região a ser investigada tem cerca de 220.000 km² e nessa primeira fase do projeto foram reinterpretadas, quanto a sua geologia, cerca de 72000 km². Todas as informações até então cartografadas, estão registradas em Banco de Dados. Os mapas geológicos estão disponíveis em papel e meio digital (SIG) na escala 1:250.000 (folhas São Romão, João Pinheiro, Três Marias e Bom Despacho) e em papel na escala 1:100.000 (folhas Serra da Ilha, Urucuia, São Romão, Serra do Boqueirão, Bonfinópolis de Minas, Santa Fé de Minas, Bocaina, Canabrava, Serra do Jatobá, João Pinheiro, Rio do Sono, Chapadão dos Gerais e Dores do Indaiá).

ESTRATIGRAFIA

A estratigrafia clássica definida regionalmente para o Grupo Bambuí por diversos autores não foi aplicada na área, face a dicotomia encontrada no campo em relação as descrições originais. Enfatizou-se a utilização do conceito de estratigrafia de seqüências na qual a unidade fundamental é a seqüência, que são delimitadas por discordâncias ou concordâncias relativas. As seqüências são subdivididas segundo o conceito de tratos de sistemas (systems tracts), que segundo BRAUN & FISHER (1977) correspondem a uma associação de sistemas deposicionais contemporâneos. As unidades de menor ordem são as parasseqüências, limitadas por superfícies de inundação marinha e em conjuntos de parasseqüências, estas, apoiadas na identificação de fácies sedimentares. A área revista (72.000 km²) do Projeto foi informalmente dividida em tratos de sistemas. Na Folha Serra do Boqueirão foram reconhecidos no Grupo Bambuí os tratos de sistemas de mar baixo (TSMB) e o de mar alto (TSMA). O TSMA é constituído pela associação de fácies C, que representa a deposição sedimentares de plataforma rasa. O TSMB, no topo do grupo, compreende duas associações de fácies (A e B), ambas relacionadas a depósitos de plataforma rasa.

Aluviões (QHa): Distribuem-se ao longo dos rios Preto, Paracatu e de seus afluentes diretos. São sedimentos inconsolidados, de natureza arenosa, areno-argilosa, argilo-siltica e localmente contém seixos e matacões de quartzo, quartzitos, arenitos, siltitos, calcários e silexitos.

Terraços Aluviais (QHi): Constituem sedimentos arenosos inconsolidados beges e amarelados, resultantes do retrabalhamento das coberturas antigas e redistribuídos em terraços e planícies. Ocorrem em cotas superiores a 500 metros.

Coberturas Eluvio-Coluviais (QPHi): São sedimentos arenosos, inconsolidados e ocorrem em áreas de grande incidência de lagoas/dolinas. Algumas dessas lagoas constituem depósitos de argila e espongilitos.

Coberturas Arenosas Eluvio-Coluviais (TQd): Compõem-se de sedimentos detríticos inconsolidados arenosos, argilo-arenosos e argilo-siltosos beges, amarelados, róseos a estbranquiçados. Ocorrem em cotas superiores a 600 metros.

GRUPO URUCUIA

Grupo Urucuia Indiviso (Kui): Predominam paraconglomerados e arenitos. Os primeiros são cinza-claros a vermelhos, com matriz arenosa média a grossa, localmente feldspática. Os seixos, mili- a centimétricos, são de arenitos, arenitos subarcoseanos, quartzo de veio e argilito e, apresentam formas irregulares, arredondadas e ovóides. O seguindo litótipo é um arenito branco a vermelho, maciço, silicificado, localmente feldspático, granulometria média a grossa, com grãos subarredondados e bem selecionados. A estratificação plano-paralela é incipiente.

GRUPO AREADO

Formação Abaeté (Kaa): Ocorre principalmente na serra do Boqueirão. Predominam ortoconglomerados róseos a avermelhados e cores a marrons, esses últimos devido a percolação por hidróxidos de ferro. Compõem-se de seixos arredondados, angulosos a subangulosos de arcóseo e quartzo leitoso, hialino e enfumaçado, suportados por uma matriz arenosa fina a grossa. Localmente, passam a constituir leitos individualizados. Alguns seixos angulosos a subangulosos são sugestivos de vertifalcto. Os conglomerados mostram um acamamento granodecrescente e exibem estratificação plano-paralela e cruzada.

GRUPO BAMBUÍ

Trato de Sistema de Mar Baixo (TSMB)

Fácies de Plataforma Rasa

Associação de Fácies A (NPba): É composta por arenitos arcoseanos ferruginosos de cor marrom e, subordinadamente, siltitos e argilitos. Os arcóseos têm granulometria fina a média, s/o bem compactados e afloram como bancos maciços, decimétricos a métricos. Estruturas primárias tais como laminação plano-paralela, estratificação cruzada, marcas de ondas, gretas de ressecamento e *hummocky* são encontradas em diversas superfícies aforantes. Em geral, essas rochas contêm muscovita detrítica e o cimento calcítico pode estar presente. Os siltitos e argilitos mostram comumente, laminação plano-paralela. Esses sedimentos foram depositados em fácies de plataforma rasa. O contato dessa unidade com as adjacentes é principalmente transicional, podendo ser brusco ou por falha contracional.

Associação de Fácies B (NPbb1, NPbb2): A **Unidade NPbb1** dominam arenitos arcoseanos associados a siltitos e argilitos subordinados. Os arenitos arcoseanos são cinza-esverdeados, finos a muito finos, bem estratificados a lenticulares, e ocorrem em leitos centimétricos a métricos. Apresentam-se em camadas tabulares, com estratificação plano-paralela dominante, marcas de ondas assimétricas, estratificação cruzada e localmente, estruturas do tipo *hummocky*. Uma característica desses arenitos é a presença de estrutura tipo "*exfoliação esferoidal ou "circular*". Os siltitos e argilitos ocorrem em camadas pouco espessas intercaladas nessa unidade. Apresentam cor e estruturas primárias similares às dos arenitos arcoseanos. A **Unidade NPbb2** é constituída de siltitos associados a arenitos arcoseanos. Os siltitos são cinza-esverdeados, geralmente têm laminação plano-paralela, e contêm intercalações centimétricas a métricas de arenitos arcoseanos cinza-esverdeados, finos a muito finos, estratificados a maciços.

Trato de Sistema DE mar Alto (TSMA):

Associação de Fácies C (NPbc1, NPbc2 e NPbc3): A **Unidade NPbc1** é continuidade de camadas normalmente tabulares e plano-paralelas de calcarenitos finos a muito finos intercalados com leitos de calcarenitos grossos até calciruditos, cinza-escuros a pretos, estratificados, com presença local de poeira carbonosa disseminada. Essas rochas, quando quebradas, geralmente exalam um odor fétido, devido a presença de sulfetos e matéria orgânica. Contêm, também, lentes de calcissiltitos e margas, cinza-escuros a pretos, com espessuras de até 1 metro. Localmente, ocorrem lentes de estromatólitos colunares e cerebróides. Estruturas primárias, tais como marcas de ondas assimétricas de amplitude pequena a média, marcas de carga, dobras convolutas e óides, são observadas. Localmente, nota-se uma gradação cíclica de camadas alternadas de calcarenitos grossos e finos. Nas brechas intraformacionais é comum a presença de fluorita associada a calcita branca neoformada. Na porção ocidental, esses calcarenitos intercalam-se com níveis centimétricos a decimétricos de siltitos cinza-escuros a negros ou arenitos muito finos cinza-esverdeados, com laminação plano-paralela, estratificação cruzada de pequeno porte, *hummocky*, *wavy*, *linsen* e marcas de ondas. A **Unidade NPbc2** é constituída de calcilutitos/calcissiltitos e margas, com intercalações subordinadas de siltitos e argilitos, e níveis ao nordeste de brecha intraformacional, além de possíveis estromatólitos. Os calcilutitos/calcissiltitos têm tonalidades variadas de bege, róseo, roxo, cinza-claro e preto. Apresentam laminação plano-paralela, estratificação cruzada de pequeno porte, marcas de ondas, gretas de contração e de ressecamento e marcas de carga. Os siltitos, argilitos e margas são cinza a cinza-escuros e amarronzados, com laminação plano-paralela e gradam para os calcilutitos/calcissiltitos. A **Unidade NPbc3** é composta de siltitos/argilitos laminados e, subordinadamente, arenitos e lentes de calcilutitos. Os siltitos, calcíferos ou não, e os argilitos apresentam coloração cinza esverdeados e, quando alterados variam de róseos a amarelados. Os arenitos subarcoseanos a arcoseanos são cinza-esverdeados, finos a muito finos e ocorrem em leitos centimétricos a decimétricos intercalados nos siltitos/argilitos. Os calcilutitos cinza a cinza-escuros apresentam-se finamente laminados e contêm marcas de ondas, gretas de ressecamento, estruturas de cargas, intraclastos e localmente, oólitos. As unidades **NPbc3**, **NPbc2** e **NPbc1** foram depositados em fácies de plataforma rasa, com exposição subaérea (**NPbc2**). Essas unidades fazem contatos transicionais, brusco e, em parte, por falhas transcorrentes com as unidades adjacentes.

GEOLOGIA ESTRUTURAL E METAMORFISMO

A deformação atuou de modo progressivo sobre os sedimentos do Grupo Bambuí, em nível de crosta superior, sob condições rúpteis/dúcteis em grau metamórfico incipiente. Duas direções de cisalhamentos de alto e baixo ângulo são reconhecidas. Uma de direção NNW no limite leste da folha próximo a Bonfinópolis de Minas e outra de direção NW que se estende desde Natalândia até a Serra do Boqueirão. Estes dois domínios estruturais, limita na porção sudeste da folha um domínio estrutural distinto prevalecendo rochas pouco deformada horizontalizada e com algumas superfícies de deformação de baixo ângulo. No restante da folha predominam rochas deformadas e dobradas com zonas de cisalhamento de alto e baixo ângulo. Estas feições são decorrentes da tectônica transpressional (regime rúptil-dúctil), de modo a gerar zonas de cisalhamentos de alto ângulo transcorrentes, oblíquas e de empurrões / retrocavalgamentos que propiciaram os movimentos das massas, tendo como feições internas dobras normalmente com eixos de direções N-NW/SSE e mergulhos, no geral suaves, tanto para N-NW quanto para S-SE. As falhas de cavalgamento que ocorrem no domínio oeste não o acamamento sedimentar, desenvolvem dobras intrafoliais, assimétricas e do tipo *flexural slip folding*. Os estilos dos dobramentos são variados e não contínuos, normalmente não cilíndricos e com um redobramento suave E-W. A tectônica rúptil tardia faz-se presente na área pela presença de fraturas e falhas de gravidade resultantes de uma fase distensiva observadas, principalmente, em escala de afloramento.

Em relação ao metamorfismo regional, as rochas do Grupo Bambuí apresentam estágios avançados de diagênese, uma vez que os sedimentos pelíticos já apresentam em sua mineralogia clorita, moscovita (sericita), caolinita e muito raramente ilita. Essa associação indica que esses sedimentos artigiram condições de grau metamórfico muito incipiente e de temperatura inferiores a 250°C. Vale mencionar que localmente esses sedimentos contêm uma poeira carbonosa ainda não recristalizada para grafita. A associação anfibólio + diopsídio + talco localmente observada nos calcários e margas, ao longo dos planos de falha ou zonas de cisalhamento, resulta da deformação intensa dessas rochas na zona imediata de movimentação.

RECURSOS MINERAIS

Areia - Depósitos aluviais inconsolidados são freqüentes nas margens dos rios e ribeirões, destacando-se as regiões municipais de Brasilândia de Minas. Estes depósitos são essencialmente aproveitados na construção civil local.

Diamante - Ocorrências restritas de diamante são encontrados em garimpos e catas são relatados em conglomerados inconsolidados da Formação Abaeté.

Espongilito e Argila para cerâmica - O espongilito constitui uma rocha sedimentar biogênica formada em ambientes continentais que contém, essencialmente, espículas silicosas associadas geralmente a argilas, matéria orgânica e carapaças diatomáceas. Estas espículas são constituintes inorgânicos formados por esponjas e micro animais primitivos multicelulares. Pode ter aplicação na indústria como matéria prima para a confecção de fijolos isolantes, carga para polímeros, insumo na fabricação do silicato de sódio, artefatos de fibrocimentos, moldes de fundição, filtros industriais entre outros. Os depósitos de argilas com espongilitos estão situados em fundos de lagoas sobrepostos aos sedimentos argilo-arenosos inconsolidados, em regiões de grande incidência de dolinas, distribuídas nas margens do rio Preto e seus afluentes diretos. Ocorrem também em lagoas situadas em áreas de relevo mais elevado, sobre rochas do Grupo Urucuia em diversos municípios da região noroeste do estado, comprovando-se a potencialidade econômica para a exploração. A argila é pouco expressiva em termos de aproveitamento econômico, porém constitui extensos depósitos situados próximos às regiões dos vales dos rios Preto Paracatu. O aproveitamento dessa argila está restrito à indústria de cerâmica vermelha de médio e pequeno porte, em geral com a produção de telhas e tijolos. Encontram-se instaladas nas imediações dos municípios de Bonfinópolis de Minas e Brasilândia de Minas.

Fósforo (P2O5) - As rochas sedimentares constituídas por arenitos e siltitos do grupo Bambuí, em geral possuem fósforo, verificado por testes de campo e também sugerido nas pequenas lavouras, onde as plantações são feita diretamente sobre rochas semi-intemperizadas misturadas com o solo residual. Projetos de prospecção regional com ensaios químicos, físicos favorecerão a seleção de áreas e delimitação de áreas potenciais.

Calcário - Ocorrem nos municípios de Natalândia e Dom Bosco e restritamente em Bonfinópolis de Minas na forma de lentes e corpos alongados. Em geral são fraturados, com preenchimento de calcita branca e preta. Sua aplicação está relacionada à produção de brita para uso na construção civil, cascalhamento de estradas, na indústria cimenteira e como corretivo de solo. Predomina calcário cinza a cinza claro, granulometria fina a média, encaixados em arenitos e siltitos.


NATALÂNDIA
DOM BOSCO
Boqueirão
Riachinho
Gado Bravo
BRASILÂNDIA DE MINAS
SERRA DO PEREGRINOS
SERRA DO BOQUEIRÃO
Rio Preto
Rio Paracatu
Córrego Garapa
Córrego Taboquinha
Córrego Água Quente
Córrego do Cotovelo
Córrego das Lajes
Ribeirão Gado Bravo
Ribeirão Santa Cruz
Córrego das Pedras
Ribeirão das Porteiras
Córrego do Mamão
Córrego do Cascavelo
Lagoa do Jacaré
Lagoa Bebedouro
Lagoa Casacavel
Lagoa Amarela
Lagoa do Porto
Lagoa do Capim
Lagoa Preta
Lagoa Grande
Ribeirão Entre Ribeiros
Córrego das Taboas
Córrego Capão Grande
Córrego Mata Limpa
Córrego Capão Comprido
Córrego Capão Verde
Córrego Capão Preto
Córrego Capão Bonito
Córrego Capão Redondo
Córrego Capão Fundo
Córrego Capão Alto
Córrego Capão Grande